



BRIXTON

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΟΚΤΟΝΩΝ

Καταπολεμήστε
τα αχρωστώδη ζιζάνια
με το BRIXTON

Η νέα πρόταση για μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία
για μεγάλες καλλιέργειες, λαχανοκομία και δενδροκομία.

Ετοιμόχρηστο και εκλεκτικό, το Brixton
δουλεύει και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες!



ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟ **BRIXTON** είναι το νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τις μεγάλες καλλιέργειες, λαχανοκομία και δενδροκομία. Χάρη στην **εξειδικευμένη μορφή** τυποποίησής του, παρέχει **εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ευελιξία**, ενάντια σε κύρια αγρωστώδη ζιζάνια.

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
Πατάτα, Ζαχαρότευτλα, Ηλιάνθος, Μηδική	Ετήσια ζιζάνια: Αλεπονουρά, Ήρα, Αγριοβρώμη, Αιματόχορτο Μουχρίτσα, Σετάρια, Βρώμος. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα, Βέλιουρας, Πολυετής Ήρα.
Ελαιοκράμβη	Ετήσια ζιζάνια - Αλεπονουρά, Ήρα, Αγριοβρώμη, Βρώμος, Σετάρια, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα.
Αγκινάρα, Σπαράγγι, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Καρότο, μάραθος, Τομάτα, Μελιτζάνα, Ραπάνια/Ραφανίδες, Χρένα, Γογγύλια, Κοκκινογούλια, Καλλωπιστικά	Ετήσια ζιζάνια: Μουχρίτσα, Αιματόχορτο, Σετάρια, Αγριοβρώμη, Ήρα. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα, Τραχεία Λειβαδοπόα, Πολυετής Ήρα, Βέλιουρας, Φεστούκα.
Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Λωτός, Ρόδι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ακτινιδιά, Φυτώρια οπωρώνων και αμπέλου	Ετήσια ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Μουχρίτσα, Σετάρια, Βρώμος, Αιματόχορτο, Ήρα, Αγριοκρίθαρο. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα, Πολυετής Ήρα, Βέλιουρας, Φεστούκα, Τραχεία Λειβαδοπόα.
Βαμβάκι	Ετήσια ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Βέλιουρας από σπόρο. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα.
Ρύζι	Μουχρίτσα, Κόκκινο ρύζι

ΠΟΙΑ ΔΟΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ;



ΕΤΗΣΙΑ

70-140 ml/στρ.

* Στο ρύζι η δόση είναι 100-160ml/στρ.



ΠΟΛΥΕΤΗ

140 ml/στρ.

* Στο βαμβάκι η μέγιστη δόση είναι 200ml/στρ.



ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ;



ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ (και φυτώρια)

Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα,
Φουντουκιά, Ακτινιδιά, Ροδιά:
1 εφαρμογή με δόση έως 133 ml/στρ.
Αμυγδαλιά, Εσπεριδοειδή, Ελιά:
2 εφαρμογές με δόση έως 133 ml/στρ.



ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Τομάτα, Σπαράγγι, Μελιτζάνα, Σκόρδο, Κρεμμύδι,
Ασκαλώνιο, Μάραθος, Καρότο, Αγκινάρα,
άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη:
1 εφαρμογή με δόση έως 140ml/στρ.



ΣΙΤΗΡΑ

Ρύζι: 1 εφαρμογή προσπαρτικά
με δόση έως 160 ml/στρ.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Βαμβάκι: 1 εφαρμογή με δόση έως 200ml/στρ.
Πατάτα, Ζαχαρότευτλα:
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΕΛΑΙΟΥΧΑ

Ηλιάνθος, Ελαιοκράμβη:
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ

ΜΗΔΙΚΗ

1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

Καλλωπιστικά :
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ BRIXTON;

ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: με έλαιο φυσικής
προέλευσης που περιλαμβάνεται στη φόρμουλα, ενισχύοντας
την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
το Clethodim με την ευρύτερη ετικέτα στην αγορά

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: το μοναδικό “dim” με έγκριση για Μηδική,
Πυρηνόκαρπα, Φουντουκιά, Λωτό, Ροδιά, Αμυγδαλιά

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ: μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα
σε όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	Clethodim 18% β/ο
Τυποποίηση	Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC). Περιέχει έλαιο φυσικής προέλευσης.
Μηχανισμός & τρόπος δράσης	Ομάδα δράσης κατά HRAC: I Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση ενάντια σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στα υπέργεια και υπόγεια μέρη του φυτού, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).
Καλλιέργειες και μέγιστη δόση εφαρμογής	100 ml/στρ.: Ελαιοκράμβη 133 ml/στρ.: Αμπέλι, Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά κ.λπ.), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά κ.λπ.), Φουντουκιά, Ροδιά, Λωτός, Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Λιμεττία), Ελιά, Αμυγδαλιά, Ακτινιδιά, Φυτώρια (αμπελιού και δενδρωδών) 140 ml/στρ.: Πατάτα, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος, Μηδική, Τομάτα, Μελιτζάνα, Μάραθος, Σπαράγγι, Αγκινάρα, Καρότο, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνιο, Ραπάνια/Ραφανίδες, Χρένα, Γογγύλια, Κοκκινογούλια, Καλλωπιστικά 160 ml/στρ.: Ρύζι 200 ml/στρ.: Βαμβάκι
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	2 σε Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Ελιά 1 σε όλες τις άλλες καλλιέργειες
Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή	3 ημέρες για αμπέλι 7 ημέρες για κερασιά, εσπεριδοειδή, ελιά, ακτινίδια, ροδιά 10 ημέρες για μηλοειδή, λωτό 14 ημέρες για βερικοκιά, ροδακινιά - νεκταρινιά, δαμασκηνιά 20 ημέρες για φουντουκιά, αμυγδαλιά 28 ημέρες για τομάτα, μελιτζάνα 30 ημέρες για σπαράγγι 35 ημέρες για κρεμμύδι, σκόρδο, ασκαλώνιο 40 ημέρες για μηδική, πατάτα, καρότο, αγκινάρα, ραπάνια/ραφανίδες, χρένα, γογγύλια, κοκκινογούλια 50 ημέρες για μάραθο 60 ημέρες για ζαχαρότευτλο Μη εφαρμόσιμο: ρύζι, ελαιοκράμβη, βαμβάκι, ηλίανθος, φυτώρια οπωρώνων-αμπελού, καλλωπιστικά
Αριθμός έγκρισης	70505/3-II-2023
Συσκευασίες	1 L και 4 L

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ΕΚΔΟΣΗ: Ιανουάριος 2024

